

# 目 录

百灵 <i>Melanocy phamongolica</i> .....	1
画眉 <i>Garrulax canorus</i> .....	2
红嘴相思鸟 <i>Leiothrix lutea</i> .....	3
红胁绣眼鸟 <i>Zosterops erythropleurus</i> .....	4
红喉歌鸲 <i>Calliope calliope</i> .....	5
蓝喉歌鸲 <i>Luscinia svecica</i> .....	6
红交嘴雀 <i>Loxia curvirostra</i> .....	7
云雀 <i>Alauda arvensis</i> .....	8
鹁哥 <i>Gracula religiosa</i> .....	9
小云雀 <i>Alauda gulgula</i> .....	10
大山雀 <i>Parus minor</i> .....	11
珠颈斑鸠 <i>Spilopelia chinensis</i> .....	12
山斑鸠 <i>Streptopelia orientalis</i> .....	13
环颈雉 <i>Phasianus colchicus</i> .....	14
暗绿绣眼鸟 <i>Zosterops japonicus</i> .....	15
棕头鸦雀 <i>Sinosuthora webbiana</i> .....	16
黑尾蜡嘴雀 <i>Eophona migratoria</i> .....	17
八哥 <i>Acridotheres cristatellus</i> .....	18
黄雀 <i>Spinus spinus</i> .....	19
乌鸫 <i>Turdus mandarinus</i> .....	20
三道眉草鹀 <i>Emberiza cioides</i> .....	21
黄喉鹀 <i>Emberiza elegans</i> .....	22
蒙古兔 <i>Lepus tolai Pallas</i> .....	23



百灵  
*Melanocorypha phamongolica*

**鉴别特征：**雄鸟额部、头顶及后颈部均为栗红色；眼前、眼周及眉纹为棕白色，左右两侧眉纹延伸至枕部相接而呈棕色；背、腰栗褐色，翅羽黑褐色；尾羽栗褐色，最外侧尾羽色淡近于白色；额、喉白色，上胸左右侧各有一黑色条斑，于上胸部相接，下体大部羽色棕白；雌鸟羽色接近雄鸟，但头顶和颈部栗红色较少；羽色略近棕黄色，上体栗色较淡，而近于淡褐色；上胸左右两侧黑色条斑不明显；嘴壳土黄色，足趾肉粉色，爪褐色；后爪长于一般鸟类的后爪，并向后方直伸。

**生活习性：**栖息于广阔的草原，出没在草滩沙丘间，善于在地面上活动。在野生环境中，百灵鸟能度过夏季高温干热天气，也能度过结冰的低温气候，但在大雪之际，为觅食充饥，百灵常会作短暂的结群迁徙。百灵喜欢沙浴，用以降温防热，并可清理羽毛和体表的污物。百灵产卵于5-7月，孵化期为12-15天，每对亲鸟一年可产卵1-3巢。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



画眉  
*Garrulax canorus*

**鉴别特征：**通体棕褐色而具细黑色纵纹，头顶纵纹明显，具白色眼圈且在眼后形成眼纹，延长至耳部，眼周具少量浅蓝色裸皮，下腹灰白色。

**生活习性：**栖息于山丘和村落附近的灌丛或竹林；主要以是农林害虫为食，兼食为植物果实、草籽等；繁殖期为4-7月，每窝产卵3-5枚。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



红嘴相思鸟  
*Leiothrix lutea*

**鉴别特征：**头黄绿色，脸颊围绕眼周黄白色，上体深橄榄绿色，喉至下腹明黄色，胸部染红色，两胁染灰色，两翼具鲜红色和明黄色翼斑，尾羽橄榄绿至黑色，中间分叉，尾下覆羽和下腹染灰色；虹膜黑褐色；喙鲜红色；脚粉褐色。

**生活习性：**栖息于山区常绿阔叶林、针阔混交林、竹林和林缘；主要以毛虫、甲虫、蚂蚁等昆虫为食，兼食植物果实、种子和少量农作物；繁殖期为5-7月，每窝产卵3-4枚。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



红胁绣眼鸟

*Zosterops erythropleurus*

**鉴别特征：**头及上背体羽橄榄绿色，具明显白色眼圈，眼先深色，喉部黄色，腹部白色，胸部灰色，尾下覆羽明黄色虹膜红褐色；喙蓝灰色；脚灰黑色。

**生活习性：**栖息于阔叶林和以阔叶树为主的针阔叶混交林、竹林、次生林等各种类型森林；主要以半翅目、膜翅目、直翅目昆虫及昆虫幼虫为食，兼食蜘蛛、小螺等小型无脊椎动物和植物果实和种子；繁殖期为4-7月，每窝产卵3-4枚，多为3枚。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



红喉歌鸲  
Calliope calliope

**鉴别特征：**头部、上体橄榄褐色；眉纹白色；颈部、喉部红色或白色，周围有黑色狭纹，胸部灰色，腹部白色。

**生活习性：**栖息于低山丘陵和山脚平原地带的次生阔叶林和混交林；主要以直翅目、半翅目和膜翅目等昆虫为食，兼食少量植物果实等；繁殖期为5-7月，每窝产卵4-5枚。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



蓝喉歌鸲

*Luscinia svecica*

**鉴别特征：**头部、上体土褐色；眉纹白色；尾羽黑褐色，基部栗红色；颈部、喉部辉蓝色，具有黑色横纹；下体白色。

**生活习性：**栖息于灌丛或芦苇丛；主要以鳞翅目、鞘翅目等昆虫和昆虫幼虫为食，兼食植物种子；繁殖期为5-7月，每窝产卵4-7枚。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



红交嘴雀

*Loxia curvirostra*

**鉴别特征：**雄鸟通体砖红色，上体较暗，腰鲜红色；翼和尾近黑色，头侧暗褐色；雌鸟暗橄榄绿或染灰色，腰较淡或鲜绿色；头侧灰色。两性均具粗大而尖端相交叉的嘴。与除白翅交嘴雀外的所有其它雀类的区别为上下嘴相侧交。繁殖期雄鸟的砖红色随亚种而有异，从橘黄至玫红及猩红，但一般比任何朱雀的红色多些黄色调。红色一般多杂斑，嘴较松雀的钩嘴更弯曲。雌鸟似雄鸟但为暗橄榄绿而非红色。虹膜深褐色，嘴近黑色，脚近黑色。

**生活习性：**栖息于寒温针叶带的各种林型中。喜欢在鱼鳞云杉至臭冷杉林和黄花落叶松—白桦林中生活。冬季游荡且部分鸟结群迁徙。性活跃，喜集群，除繁殖期间单独或成对活动外，其他季节多成群。主要以针叶树种子为食，尤其喜欢吃落叶松子，也吃红松子、榛子、树叶、花序、浆果等其他树木和灌木种子和果实及草子、昆虫。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



云雀  
*Alauda arvensis*

**鉴别特征：**背部花褐色和浅黄色，胸腹部白色至深棕色。外尾羽白色，尾巴棕色。后脑勺具羽冠，适应于地栖生活，腿、脚强健有力，后趾具1长而直的爪；跗跖后缘具盾状鳞；以植物种子、昆虫等为食，常集群活动；繁殖期雄鸟鸣啭洪亮动听，是鸣禽中少数能在飞行中歌唱的鸟类之一。

**生活习性：**栖息于草地、干旱平原、泥淖及沼泽，正常飞行起伏不定，警惕时下蹲。每窝产卵3-5枚，孵化期10-12天。

**保护级别：**国家Ⅱ级重点保护野生动物



鹪哥  
*Gracula religiosa*

**鉴别特征：**通体黑色而泛蓝紫色光泽，头后部两侧具标志性的鲜黄色裸皮和肉垂，初级飞羽基部白色而形成明显块状翼斑。

**生活习性：**栖息于低山丘陵和山脚平原地区的次生林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、竹林和混交林；主要以蝗虫、白蚁等昆虫为食，兼食无花果、榕果等植物果实和种子；繁殖期为4-6月，每窝产卵2-3枚，多为3枚。

**分布：**国内分布于西藏、云南、广西、海南、香港；国外分布于不丹、文莱、柬埔寨、印度、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

**保护级别：**国家II级重点保护野生动物



小云雀  
*Alauda gulgula*

**鉴别特征：**体型较小，具耸起的短羽冠且有细纹；上体沙褐色，布满黑褐色羽干纹；下体为淡棕色，翼黑褐色，尾羽为黑褐色带有棕白色窄羽缘。

**生活习性：**栖息于开阔平原、草地、低山平地、河边、沙滩、草丛、坟地、荒山坡、农田和荒地以及沿海平原；主要以禾本科、沙草科等植物为食，兼食鳞翅目、鞘翅目等昆虫和昆虫幼虫；繁殖期为4-7月，每窝产卵3-5枚。

**保护级别：**“三有”动物



大山雀  
*Parus minor*

**鉴别特征：**头额至后颈为黑色，胸腹部中央有一道黑色宽纵纹，上体为蓝灰色，下体颊、喉和上胸为黑色，其余下体为白色或微沾黄。

**生活习性：**栖息于低山和山麓地带的次生阔叶林、阔叶林、针阔叶混交林、人工林和针叶林；主要以鳞翅目、双翅目、鞘翅目、半翅目、直翅目、同翅目、膜翅目等昆虫和昆虫幼虫为食，兼食少量蜘蛛、蜗牛等小型无脊椎动物和草籽、花等；繁殖期为4-8月，每窝产卵6-13枚，多为6-9枚。

**保护级别：**“三有”动物



珠颈斑鸠

*Spilopelia chinensis*

**鉴别特征：** 鉴别特征：身形修长，上体淡褐色，下体土色，颈侧长有满是白点的黑色块斑；虹膜橘黄色；喙黑色；脚红色

**生活习性：** 栖息于有稀疏树木生长的平原、草地、低山丘陵和农田地帶，也常出现于村庄附近的杂木林、竹林及地边树上；主要以植物种子为食，兼食蝇蛆、蜗牛、昆虫等；繁殖期为3-7月，每窝产卵2枚。

**保护级别：** “三有” 动物



山斑鸠

*Streptopelia orientalis*

**鉴别特征：**颈侧具有带明显黑白色条纹的块状斑，上体深褐色且具扇贝状斑纹，下体多偏粉色；虹膜黄色；喙灰色；脚粉红色。

**生活习性：**栖息于低山丘陵、平原和山地阔叶林、混交林、次生林、果园和农田耕地以及宅旁竹林和树上；主要以植物幼芽、浆果、种子以及大豆、小麦等各种农作物及为食；繁殖时间为4-7月，每窝产卵2枚。

**保护级别：**“三有”动物



环颈雉

*Phasianus colchicus*

**鉴别特征：**体型略小于家鸡，雌雄二态明显。雄鸟羽色艳丽，具金属光泽，有特征性的耳羽簇和较长的带斑尾羽；雌鸟体型较小，羽色以褐色为主，布满深色斑纹，尾羽较短。

**生活习性：**栖息于低山丘陵、农田、地边、沼泽草地，以及林缘灌丛和公路两边的灌丛与草地；主要以各种植物的果实、种子、叶、芽、草籽以及各种昆虫和其他小型无脊椎动物为食；繁殖期为3-7月，每窝产卵6-22枚。

**保护级别：**“三有”动物



暗绿绣眼鸟  
*Zosterops japonicus*

**鉴别特征：**头及上体橄榄绿色，具明显的白色眼圈，前额和喉部黄色，胸浅灰色，腹部白色，尾下覆羽鲜黄色。虹膜褐色；喙蓝灰色；脚灰黑色。

**生活习性：**栖息于阔叶林和以阔叶树为主的针阔叶混交林、竹林、次生林等各种类型森林；主要以半翅目、膜翅目、直翅目昆虫及昆虫幼虫为食，兼食蜘蛛、小螺等一些小型无脊椎动物和植物果实和种子；繁殖期为4-7月，每窝产卵3-4枚，多为3枚。

**保护级别：**“三有”动物



棕头鸦雀

*Sinosuthora webbiana*

**鉴别特征：**体型小，全身粉棕褐色，头和两翼更偏棕红色，喉偏白色而具棕红色细纵纹，尾棕褐色；虹膜黑褐色；喙灰褐色；脚棕褐色或铅褐色。

**生活习性：**栖息于中低山阔叶林和混交林林缘灌丛地带；主要以鞘翅目、鳞翅目等昆虫为食，兼食蜘蛛等小型无脊椎动物和植物果实与种子；繁殖期为4-8月，每窝产卵4-5枚。

**保护级别：**“三有”动物



黑尾蜡嘴雀  
*Eophona migratoria*

**鉴别特征：**体型略大；喙色浅而硕大，黄色而端黑；头部黑色或全灰色，体灰，两翼和尾羽辉黑色，两胁沾棕黄色；虹膜褐色；脚粉褐色。

**生活习性：**栖息于低山和山脚平原地带的阔叶林、针阔叶混交林、次生林和人工林；主要以种子、果实等为食，兼食部分膜翅目、鞘翅目等昆虫和小螺狮等小型无脊椎动物；繁殖期为5-7月，每窝产卵3-7枚，多为4-5枚。

**保护级别：**“三有”动物



八哥  
*Acridotheres cristatellus*

**鉴别特征：**体型大；通体黑色，前额具簇状短羽冠；尾端有狭窄的白色，尾下覆羽，具黑及白色横纹，脚暗黄色；两翼具白色翼斑，飞行时甚为醒目。

**生活习性：**栖息于山地、丘陵以及平原地区的村落及其附近开阔地；主要以甲虫、蝇蛆等昆虫、植物果实和种子为食；繁殖期为4-7月，每次产卵4-6枚。

**保护级别：**“三有”动物



黄雀  
*Spinus spinus*

**鉴别特征：**体型甚小，喙短、直而尖细，翼上具醒目的黑色和黄色条纹；雄鸟顶冠及颈黑色，头侧、腰及尾基部亮黄色；雌鸟多纵纹，顶冠和颈无黑色。

**生活习性：**栖息于山林、丘陵和平原地带；主要以多种植物的果实和种子为食，兼食少量昆虫；繁殖期为5-7月，每窝产卵为5-6枚。

**保护级别：**“三有”动物



乌鸫

*Turdus mandarinus*

**鉴别特征：**雄鸟通体黑色，雌鸟通体黑褐色，颏、喉和上胸具褐色纵纹。

**生活习性：**栖息于次生林、阔叶林、针阔叶混交林和针叶林等各种森林；主要以双翅目、直翅目等昆虫和昆虫幼虫为食，兼食植物果实和种子；繁殖期为4-7月，每窝产卵4-6枚。

**保护级别：**“三有”动物



三道眉草鹀  
*Emberiza cioides*

**鉴别特征：**黑白色头部图纹和栗色的胸带，以及白色的眉纹。繁殖期雄鸟脸部有别致的褐色及黑白色图纹，胸栗，腰棕。雌鸟色较淡，眉纹及下颊纹黄色，胸浓黄色。三道眉草鹀的冬春季食谱以野生草种为主，夏季以昆虫为主。

**生活习性：**栖息于开阔地环境中活动，见于丘陵地带和半山区地稀疏阔叶林地，山麓平原或山沟的灌丛和草丛中以及远离村庄的树丛和农田。

**保护级别：**“三有”动物



黄喉鹀  
*Emberiza elegans*

**鉴别特征：**雄鸟有一短而竖直的黑色羽冠，眉纹自额至枕侧长而宽阔，前段为黄白色、后段为鲜黄色。背栗红色或暗栗色，颈黑色，上喉黄色，下喉白色，胸有一半月形黑斑，其余下体白色或灰白色。雌鸟和雄鸟大致相似，但羽色较淡，头部黑色转为褐色，前胸黑色半月形斑不明显或消失。一般主食植物种子。

**生活习性：**栖息于低山丘陵地带的次生林、阔叶林、针阔叶混交林的林缘灌丛中，尤喜河谷与溪流沿岸疏林灌丛，也栖息于生长有稀疏树木或灌木的山边草坡以及农田、道旁和居民点附近的小块次生林内；繁殖期为5-7月，每窝产卵5-6枚。

**保护级别：**“三有”动物



蒙古兔  
*Lepus tolai* Pallas

**鉴别特征：**全身背部为沙黄色，杂有黑色。头部颜色较深，在鼻部两侧面颊部，各有一圆形浅色毛圈，眼周围有白色窄环。耳内侧有稀疏的白毛。腹毛纯白色。臀部沙灰色。颈下及四肢外侧均为浅棕黄色。尾背面中间为黑褐色，两边白色，尾腹面为纯白色。冬毛长而蓬松，有细长的白色针毛，伸出毛被外方。夏毛色略深，为淡棕色。

**生活习性：**栖息于平原、荒草地、山坡灌丛、丘陵平原、农田和苗圃等处。食植物性食料，种类相当多：青草、树苗、嫩枝、树皮以及各种农作物、蔬菜与种子都可充当它们的食物。每年产2—3胎，分布于长江流域的可达4—5胎。雄兔有争偶行为。雌性孕期约1.5个月，早春产仔较多。每胎产2-6仔。幼仔1月龄能独立生活。

**保护级别：**“三有”动物